

## *Ophrys* :

### 1, Pas de pseudo-yeux à la base du labelle

**Pseudocopulation abdominale** (l'insecte place sa tête vers le bas)

#### 2, Bordure du labelle plane ou concave, large et entièrement jaune

= *Ophrys lutea* Cav. subsp. *Lutea*

#### 2, Bord du labelle généralement rabattu, plutôt brun ou très étroitement bordé de jaune

##### 3, Labelle en forme de « gant de boxe »

**Présence d'un oméga blanc bien visible sous la macule**

Sillon médian du labelle présent mais atténué

Pilosité du labelle importante

= *Ophrys vasconica* (O.Danesch & E.Danesch) P.Delforge

##### 3, Labelle non en forme de « gant de boxe » (plus étalé)

**Oméga blanc absent ou rarement peu présent**

Pilosité du labelle pas aussi importante

##### 4, Floraison de fin février à début avril

Labelle généralement bien plus long que les pétales latéraux

Sillon médian du labelle court et en V

= *Ophrys lupercalis* Devillers & Devillers-Tersch.

##### 4, Floraison de mi-avril à mai

Labelle généralement pas ou guère plus long que les pétales latéraux

Sillon médian long, traversant toute la macule

= *Ophrys sulcata* Devillers & Devillers-Tersch.

### 1, Présence de pseudo-yeux à la base du labelle

**Pseudocopulation céphalique** (l'insecte place sa tête vers le haut)

#### 2, Pétales latéraux filiformes

= *Ophrys insectifera* L.

#### 2, Pétales latéraux non filiformes (larges de plus de 1,5 mm)

##### 3, Sépales généralement verts, non rose intense

##### 4, Labelle petit, moins long que le sépale dorsal (fleur petite)

= *Ophrys araneola* Rchb.

##### 4, Labelle plus grand, au moins aussi grand que le sépale dorsal (fleur plus grande)

##### 5, Champ basal nettement plus clair que le reste du labelle

= *Ophrys aranifera* Huds. subsp. *aranifera*

##### 5, Champ basal de même couleur ou plus sombre que le reste du labelle

##### 6, Pétales plutôt larges et colorés avec un labelle sombre rougeâtre

##### 7, Gibbosités latérales du labelle très proéminentes

à pilosité assez longue et dense à l'extérieur, et glabres à l'intérieur

= *Ophrys incubacea* Bianca

##### 7, Gibbosités latérales du labelle très peu marquées

à pilosité plutôt courte

= *Ophrys passionis* Sennen [in Sched., cum descr.]

##### 6, Pétales plus élancés avec un labelle moins sombre et moins rougeâtre

= *Ophrys arachnitiformis* Gren. & Philippe

##### 3, Sépales roses

##### 4, Bec (dernière extrémité) du gynostème courbé

= *Ophrys apifera* Huds. subsp. *apifera*

4, Bec (dernière extrémité) du gynostème droit

5, **Pétales latéraux à sommet tronqué arrondi**, plus rectangulaires que triangulaires

6, **Macule limitée au centre du labelle**

= *Ophrys magniflora* Melki & Geniez

6, **Macule en forme de H plus ou moins complexe, allant jusqu'au champ basal**

= *Ophrys arachnitiformis* Gren. & Philippe

5, **Pétales latéraux triangulaires** de larges et courts à fins et allongés

6, **Pétales latéraux larges à la base** (non élancés)

Fleurs grosses à labelle souvent massif

= *Ophrys aegirtica* P.Delforge

6, **Pétales latéraux assez fins même à la base** (plus allongés)

Fleurs plus petites à labelle plutôt allongé

6, **Pétales latéraux larges de 1,5-3 mm à la base**

Floraison d'avril à mi-mai

= *Ophrys scolopax* Cav. subsp. *scolopax*

6, **Pétales latéraux de 1 mm de large même à la base**, très allongés et très fin

Floraison plus tardive de fin mai à juin

= *Ophrys picta* Link