

Ophrys :

1, Pas de pseudo-yeux à la base du labelle

Pseudocopulation abdominale (l'insecte place sa tête vers le bas)

2, Bordure du labelle plane ou concave, large et entièrement jaune

= *Ophrys lutea* Cav. subsp. *Lutea*

2, Bord du labelle généralement rabattu, plutôt brun ou très étroitement bordé de jaune

3, Labelle en forme de « gant de boxe »

Présence d'un oméga blanc bien visible sous la macule

Sillon médian du labelle présent mais atténué

Pilosité du labelle importante

= *Ophrys vasconica* (O.Danesch & E.Danesch) P.Delforge

3, Labelle non en forme de « gant de boxe » (plus étalé)

Oméga blanc absent ou rarement peu présent

Pilosité du labelle pas aussi importante

4, Floraison de fin février à début avril

Labelle généralement bien plus long que les pétales latéraux

Sillon médian du labelle court et en V

= *Ophrys lupercalis* Devillers & Devillers-Tersch.

4, Floraison de mi-avril à mai

Labelle généralement pas ou guère plus long que les pétales latéraux

Sillon médian long, traversant toute la macule

= *Ophrys sulcata* Devillers & Devillers-Tersch.

1, Présence de pseudo-yeux à la base du labelle

Pseudocopulation céphalique (l'insecte place sa tête vers le haut)

2, Pétales latéraux filiformes

= *Ophrys insectifera* L.

2, Pétales latéraux non filiformes (larges de plus de 1,5 mm)

3, Sépales généralement verts, non rose intense

4, Labelle petit, moins long que le sépale dorsal (fleur petite)

= *Ophrys araneola* Rchb.

4, Labelle plus grand, au moins aussi grand que le sépale dorsal (fleur plus grande)

5, Champ basal nettement plus clair que le reste du labelle

= *Ophrys aranifera* Huds. subsp. *aranifera*

5, Champ basal de même couleur ou plus sombre que le reste du labelle

6, Pétales plutôt larges et colorés avec un labelle sombre rougeâtre

7, Gibbosités latérales du labelle très proéminentes

à pilosité assez longue et dense à l'extérieur, et glabres à l'intérieur

= *Ophrys incubacea* Bianca

7, Gibbosités latérales du labelle très peu marquées

à pilosité plutôt courte

= *Ophrys passionis* Sennen [in Sched., cum descr.]

6, Pétales plus élancés avec un labelle moins sombre et moins rougeâtre

= *Ophrys arachnitiformis* Gren. & Philippe

3, Sépales roses

4, Bec (dernière extrémité) du gynostème courbé

= *Ophrys apifera* Huds. subsp. *apifera*

4, Bec (dernière extrémité) du gynostème droit

5, **Pétales latéraux à sommet tronqué arrondi**, plus rectangulaires que triangulaires

6, **Macule limitée au centre du labelle**

= *Ophrys magniflora* Melki & Geniez

6, **Macule en forme de H plus ou moins complexe, allant jusqu'au champ basal**

= *Ophrys arachnitiformis* Gren. & Philippe

5, **Pétales latéraux triangulaires** de larges et courts à fins et allongés

6, **Pétales latéraux larges à la base** (non élancés)

Fleurs grosses à labelle souvent massif

= *Ophrys aegirtica* P.Delforge

6, **Pétales latéraux assez fins même à la base** (plus allongés)

Fleurs plus petites à labelle plutôt allongé

6, **Pétales latéraux larges de 1,5-3 mm à la base**

Floraison d'avril à mi-mai

= *Ophrys scolopax* Cav. subsp. *scolopax*

6, **Pétales latéraux de 1 mm de large même à la base**, très allongés et très fin

Floraison plus tardive de fin mai à juin

= *Ophrys picta* Link